

ABSTRACT

L'opacité ronde circonscrite est l'un des signes sémiologiques le plus fréquemment rencontré dans la pathologie de la glande mammaire.

Le plus souvent bénignes, ces opacités peuvent être trompeuses et s'avérées malignes dans 2 à 10% des cas.

Ces images vue sur les deux incidences ou sur une seule incidence constituent la première cause d'erreur d'interprétation ce qui justifie l'angoisse par crainte de laisser passer une pathologie maligne ou bien de faire trop de faux positifs.

La difficulté c'est de reconnaître les images relevant des variantes de la normale et toutes lésions évidentes bénignes ainsi que celles qui relèvent d'une vérification histologique. Malgré le recours aujourd'hui à l'échographie de haute résolution, à l'IRM dont les indications restent encore limitées voire codifiées, la biopsie, la clinique et la mammographie demeurent les examens essentiels pour les classer (classification BIRADS) déterminant ainsi la conduite à tenir.

Cette conférence qui a un but pédagogique va nous permettre de situer et d'insister sur le rôle des différentes techniques et des différents éléments d'appréciation à savoir l'âge, le contexte clinique et la bonne connaissance de la sémiologie afin d'éviter les errances et les erreurs diagnostic.

Mots clés : sein, opacité circonscrite, mammographie, échographie.